

"培力" 賜福 您 膠囊5公絲(服納利林) Sufuni Capsules 5mg (Flunarizine)

【成 分】每膠囊含Flunarizine Hydrochloride 5.9mg
(Equivalent to Flunarizine 5mg)

【賦 形 劑】Lactose, Potato Starch, Microcrystalline Cellulose, Talc

膠囊劑：Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Purified Water, Titanium Dioxide, Tartrazine, Sunset Yellow FCF

【適 應 症】噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病、末梢血管循環障礙。

【用法用量】本藥須由醫師處方使用。

一般成人劑量：預防暈車、暈船；旅遊前服用10mg。

一般兒童劑量：劑量尚未確立。

【注意事項】

- 很少患者會於本藥治療期間發生疲倦且逐漸嚴重的現象，若此情形發生，須停止用藥。
- 不可超過建議服用劑量，長期維持劑量之患者，須定期回診檢視，以便即早發現錐體外症狀及抑鬱等症狀而停止用藥。而若發現治療效果逐漸不明顯，亦須停藥。
- 於人類懷孕期間使用本藥之安全性報告尚未建立。於動物研究顯示，本藥對懷孕各過程或現象（包括對胚胎或胎兒，受孕之過程，產前或產後發育）不產生直接或間接之副作用。
- 本藥可從狗乳汁中分泌出，且Flunarizine於乳汁中之濃度高於血漿，目前尚無Flunarizine於人體乳汁中分泌之數據，但仍不建議授乳期之婦女使用本藥。
- 過量：基於Flunarizine藥理學上之特性，在過量下嗜睡及無力感應當會出現，很少有急性過量的現象被報告，曾有一次服用600mg，其症狀為嗜睡，紊亂及心悸。Flunarizine沒有特殊之解毒劑，其處理方式為輔助療法，包括服用活性碳、洗胃或嘔吐。
- 開車或操作機械：由於會產生嗜睡現象，特別是在治療之初，所以需要駕車或操作危險機械的患者服用本劑時應小心。
- 禁忌：有抑鬱病史之患者，或目前有帕金森氏症之患者，及其他錐體束外異常之患者。

【相互作用】

- 當本藥與酒精、安眠藥，或鎮靜劑合用時會產生過度鎮靜現象。
- 本藥未發現與Beta-blocker產生配合禁忌。

【副 作 用】

- 最常見的副作用為嗜睡或疲倦，但都是暫時性的，以及體重增加或食慾增加。
- 下列為於慢性治療期間可能發生較嚴重之副作用：
 - 抑鬱——尤其是有抑鬱病史之女性患者，其危險性更高。
 - 錐體束外的症狀——如運動遲鈍、靜坐不能，口部及顏面運動困難、震顫，年紀較大者危險性較高。
- 較少發生之副作用有：
 - 消化系統——胸口灼熱、噁心、胃痛。
 - 中樞神經系統——失眠、焦慮。
 - 其他——口乾、肌肉痛、皮膚發紅。

【臨床藥理】Flunarizine為一選擇性的鈣離子阻斷劑，能防止細胞內鈣離子之過份負荷，但不影響心臟及血管平滑肌細胞之正常鈣離子通路。Flunarizine從消化道吸收良好，大部份由肝臟代謝，其代謝物經由膽汁從糞便中排泄。

【儲 存】25°C以下，於原包裝儲存。

【包 裝】4~1000粒塑膠瓶裝，鋁箔盒裝。



培力藥品工業股份有限公司

地址：407台中市西屯區工業區六路11號

電話：04-23592576(代表號)

傳真：04-23590992

SFP-D_03