



華興製藥

小兒喘息治療劑

“華興” 安喘康 栓劑

Athmacon Suppositories "H.S."

衛署藥製字第 037645 號
(G-4212)

《簡 介》

本品可刺激交感神經，有支氣管擴張作用，擴張冠狀血管作用。

《成 分》

每顆栓劑含：

DL-Methylephedrine Hydrochloride.....10mg
Diprophylline.....100mg

《適 應 症》

氣管與支氣管痙攣。

《用法用量》

小孩 1 次 1 顆，大人 1 次 1~2 顆，一天 1~2 次，間隔 6~12 小時，必要時，於就寢前在直腸插入 1 顆，20 公斤以下小兒宜分割投與。本藥須由醫師處方使用。

《注意事項》

1. 連續過度使用時，脈搏不整，會引起心臟停止。
2. 對以下患者慎重投與：
心疾患、癲癇、甲狀腺機能亢進症、急性腎炎。
3. 和以下藥劑併用，會增強作用，宜減量慎重投與：MAO 阻害劑、甲狀腺製劑(Thyroxine Liothyronine 等)。
4. 併用 Epinephrine、Isoprenaline、Catecholamine，脈搏會不整，恐會引起心臟停止，避免併用。
5. 本劑與其他 Xanthine 系藥劑或中樞神經興奮劑作用，會有過度的中樞神經刺激作用存在，此類藥劑最好不要併用，不得已時，減量慎重投與。
6. 限直腸使用。

《禁 忌》

對 Xanthine 系藥劑有嚴重副作用的既往歷患者。

《副 作 用》

1. 循環器：有頻脈、心悸亢進、顏面蒼白等症狀。
2. 經神神經系：頭痛、失眠、眩暈、神經過敏、熱感、疲勞感等症狀。
3. 消化器：有噁心、嘔吐、食慾不振、下痢、腹痛、胃部膨滿感、口渴等症狀。
4. 過敏症：出現發疹等過敏症狀，停止投與。
5. 投與部位：對直腸投與，偶有便意，局部不舒服、搔癢等症狀出現。

《包 裝》

2~100 顆盒裝。

本品代號：Athmacon 146

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號

服務專線：(04)8832121~6