

尿道腸道抗菌劑

"居禮"美朗膠囊

Curiemylon Capsules

內衛藥製字第 08619 號

居禮美朗膠囊 Curiemylon Capsules 之主成份 Nalidixic Acid 係美羅溫莎大藥廠研究所新發明之藥味 (Naphthyridines) 衍生物，化學名為 1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid 每膠囊含量為 0.5Gm 居禮美朗膠囊與目前市售一般消炎劑如：抗生素、磺胺劑或其他藥物雖然相異，故毋須顧慮抗藥病菌或交叉抗藥病之存在。

居禮美朗膠囊經過多次臨床試驗，確實其高度抗菌作用，尤其對於造成尿道及腸道感染症之革蘭氏陰性菌屬，具有良效。故間世不久即受美、歐、日等各國醫藥界之重視與推崇。

特 級：

1. 居禮美朗膠囊因系新型化學製劑，無抗藥病菌交叉抗藥病菌之虞，且其抗菌作用較諸市售一般抗生素，磺胺劑或其他藥物為高，故不論其病原菌之判別已否，及早服用本劑可為最佳治療。

2. 居禮美朗膠囊臨床效果極高，對於曾經接受抗生素、磺胺劑或其他藥物治療無效之患者亦能獲得高度療效。

3. 居禮美朗膠囊安全性極佳。無抗生藥、磺胺劑或其他藥物所常見嚴重副作用如：損傷胰島素、腎、肝臟障礙，破壞血液（再生障礙性貧血、粒性白血球缺乏症、嗜血性貧血等）。

4. 居禮美朗膠囊無蓄積作用，亦無念珠菌、真菌（黴菌）過度繁殖之虞，對腸內無害細菌亦無影響。因此不造成維他命缺乏症。

抗 菌 作 用：

居禮美朗膠囊對於常見之極多數病原菌如革蘭氏陰性菌及抑制病菌能力。於極強度下居禮美朗膠囊對於革蘭氏陰性菌屬下之大腸桿菌 (E. Coli)，數種變形桿菌屬 (Proteus)，氣桿菌屬 (Aerobacter)，克雷白氏肺炎菌 (Klebsiella pneumoniae)，奈瑟氏淋菌 (Neisseria Gonorrhoeae)，百日咳 (H. pertussis)，志賀氏菌屬 (Shigella)，沙門氏菌屬 (Salmonella) 及革蘭氏陽性菌屬下之炭疽桿菌 (Bacillus Anthracis V)，魏氏桿菌 (C. welchii) 等諸菌皆能奏效。

臨床外：

1. 居禮美朗膠囊對於尿道感染症奏效特佳，病症包括膀胱炎、腎盂炎、腎盂腎炎、前列腺炎、尿道炎、膀胱炎。

2. 居禮美朗膠囊對於經其他藥物治療無效之抗黑色素病疾奏效特佳。

腸道及膽道感染症：

居禮美朗膠囊對於沙門氏病原菌所致痢疾、腸炎、赤痢等腸道感染症，收效極為優異。

居禮美朗膠囊對於腸道感染症之治療效果比 Neomycin, Kanamycin, Chloramphenicol, Dihydrostreptomycin, Erythromycin, Paramomycin, Furaltadone 等為優異，而且不影響腸內有益細菌 (flora) 之存在，故無耗他命缺乏之害，同時亦因無急珠狀菌及難治之口腔炎或陰道炎等副作用。

居禮美朗膠囊對於其他之病原菌如變形菌 (Proteus)，埃氏大腸桿菌 (E. coli) 雜球菌 (Streptococcus Faecalis) 等所致腸道感染及膽囊炎、膽管炎等亦呈極佳療效。

適 用 症：

1. 急慢性尿道感染症 (尿道炎、膀胱炎、腎盂腎炎、尿後腎盂炎、前列腺炎、尿管管衝引紀之發炎)。

2. 急慢性腸道感染症及膽道感染症 (細菌性痢疾、赤痢、腸炎、膽囊炎、膽管炎)。

3. 肺病。

用 量、用 法：

成人：尿道感染症及肺病：治療量每次 1 Gm (2 枝) 一日 4 次，通常約需 1 週 (重症時可能須 2 週之久)，以後改為維持量直至治癒為止，維持量為每次 0.5Gm (1 枝) 一日 4 次。

腸道感染症：每次 0.5~1 Gm (1~2 枝) 一日 4 次 (通常只需 1~2 日即可)。

孩童：治療量按每日量 25~50 mg/kg 分 2~4 次服用，維持量減半。本藥須由醫師處方使用，孩童治療量通常如下表，惟應按其發育情形酌予加減。(14 歲以上按成人量服用)。

本表僅供醫師作為參考之用。

年 齡	每 次 服 用 量	每 日 次 數	每 日 總 用 量
出生滿 1 個月至 1 歲	125 mg (1/2 枝)	2~4 次	250~500 mg
1~2 歲	250 mg (1/2 枝)	2~3 次	500~750 mg
2~6 歲	250 mg (1/2 枝)	3~4 次	750~1000 mg
6~14 歲	500 mg (1 枝)	2~4 次	1~2 Gm

注意事項：

1. 早產及出生未滿 1 個月嬰兒以及懷孕未滿 3 個月之孕婦，在未獲得充足之臨床試驗確證前，以暫避用本劑為宜。

2. 居禮美朗膠囊通常毋需長期服用，惟如必須長期服用時，宜每隔 2 週定期檢查尿及 BUN。

3. 居禮美朗膠囊不影響糖尿病患者碳水化合物之新陳代謝，惟糖尿病患者於服用本劑期間檢驗糖尿時應採用試紙法如 Clinistix Test-Tape 等，而不宜使用 Benedict Fehling 或 Clinitest 等法，以避免發生錯誤。

4. 薑因居禮美朗膠囊在體內部份即變成熊果酸結合物 (Glucuronic Conjugate) 排出體外，此時如使用還原法 (即 Benedict Fehling, Clinitest) 檢驗糖尿時易發生錯誤之故。

每膠囊含 1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid 即 Nalidixic Acid 500mg

包 裝：

30's 50's 100's 500's 1000's 精玻璃瓶裝。