

衛署藥製字第 034353 號
G-2523 Code No.31213

皮膚疾患治療劑

佳利

乳膏

Metagin

Cream

佳利乳膏結合強效抗發炎型皮質類固醇 Betamethasone 之衍生物，為 Betamethasone Valerate，經皮膚吸收效果佳，適用於皮膚病之治療、抑制皮膚之發炎與過敏現象。另配合 Gentamicin Sulfate 對革蘭氏陽性菌、革蘭氏陰性菌及抗酸性菌具有抗菌作用，尤其對綠膿桿菌、變形桿菌、肺炎桿菌及大腸桿菌具有很強殺菌作用。

【成分】每公克含：

有效成分及含量：

Betamethasone Valerate.....1.2 mg

Gentamicin Sulfate.....1.5 mg

(equivalent to Gentamicin).....1.0 mg)

其他成分(賦形劑)：Bees Wax、Liquid Paraffin、Stearyl Alcohol、Cetyl Alcohol、Sorbitan Tristearate、Propylene Glycol、Potassium Phosphate Monobasic、Water Purified、Gascon、Chlorocresol、Butylated Hydroxytoluene、Span 60、Polyoxyl 40 Stearate、Fragrance

【用途(適應症)】

急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染、濕疹或皮膚炎。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 1. 曾因本藥成分引起過敏。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 3 歲以下。
 2. 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 1. 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 2. 要使用於臉部。
- 四、其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量或使用次數。

4. 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
6. 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。
7. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立即以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
8. 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
9. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
10. 本藥不可連續使用超過 7 天。
11. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
12. 臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。

【用法用量】1 日 1~ 至數回，適量塗抹於患處。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痂子、毛細管擴張。
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。
耳朵	耳毒性。
腎臟	腎毒性。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有上述外之其他不適情況產生。
2. 使用 7 天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】100 公克以下塑膠軟管裝、積層管裝。450 公克以下塑膠罐裝。

【儲存】緊密容器貯存於 25°C 以下。避光貯藏。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

1905-01

Made in Taiwan



溫士頓醫藥股份有限公司
台南市永康區鹽洲里仁愛街117號