

使用時請務必閱讀本說明書。
請妥善保管本說明書，以備日後參考。

獅美露康德目耀眼藥水

當出現眼睛乾澀、眼睛模糊等的症狀時，可使用含有「氨基酸」及「礦物質」等成分之「SMILE contact pure」。


眼藥水

- 具高潤濕效果，以及改善眼睛疲勞的效果。因為本產品配有可能維持潤濕的成分，所以可以防止因由乾澀所造成的新不舒服感。此外還加上氨基酸成分（牛磺(taurine)、L-天門冬胺酸鉀(L-aspartic acid potassium)）和礦物質成分(氯化物)，可以有效的改善對眼睛的疲勞。
- 不含四級鋅(benzalkonium chloride)、山梨酸鉀(potassium sorbate)等的防腐劑。是不會刺激眼睛的眼藥水。

「開關轉動型蓋子(twist cap)的方法」

開關時請將蓋子朝上。

※開關時按住容器中心的話，眼藥水有可能噴出。



成分(100mL中)

有效成分	含量
Sodium Chondroitin Sulfate	0.25g
Taurine	1.0g
Potassium L-Aspartate	0.5g
Sodium Chloride	0.3g

*賦形劑含有Tronetamol、Boric Acid、Sodium Borate、Disodium Edetate Hydrate、Polysorbate 80

- 用途(適應症) 眼睛疲勞，暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

● 使用上注意事項

- 有下列情形者，請勿使用：(A) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(A) 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑師：(A) 青光眼的人。
- 其他使用上注意事項

(A) 為防止兒童誤食請妥善保管。(B) 避免陽光直射。

(C) 使用前，請洗淨雙手。(D) 請依照藥品標示使用。

(E) 以下情形，請勿繼續使用。

- 超過保存期的眼藥水。
- 開瓶 28 天後。
- c. 藥液混濁、變色或出現異物時。
- 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
- 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：

 - 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上。
 - 使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。
 - 配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。
 - 過度使用會增加眼睛紅腫。

● 用法、用量

一天 3 至 4 次，每次 1 至 2 滴。



● 護語

- 一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 連續使用三天症狀沒有改善。
- 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
- 若有任何不適情況產生。

107. 6.

包裝：100毫升以下塑膠瓶盒裝 製造批號：請見外盒標示
保存期限：請見外盒標示 儲存條件：30°C以下
製造銷售商：LION Corporation 〒130-8644 1-3-7, honjo, sumida-ku, tokyo
製造廠：Nitto Medic Co., Ltd. Yatsuo Plant
廠址：1-14-1 YASUCHI, YATSUO-MACHI, TOYAMA CITY, TOYAMA 939-2366, JAPAN
藥商：獅王家品股份有限公司 地址：新北市三重區重新路四段97號18樓11
諮詢電話：0800-241972
原產地：日本

