

合成副腎皮質荷爾蒙製劑

內衛藥製字第03321號

保克速能片 5公絲

Poke Solon Tablets.

EACH TABLET CONTAINS:

【主成分】

Prednisolone, 5mg

【賦形劑】

Lactose、Magnesium Stearate、Potato Starch、Propylene Glycol、
Purified Water、Povidone、Silicon Dioxide、Sodium Starch Glycolate

【本質】

保克速能係由Hydrocortisone的1及2位置炭素脫氫所合成的副腎皮質荷爾蒙，係白色或淡黃色的結晶性粉末有苦味。

【特長】

本劑對Cortisone 及Hydrocortisone 有效的所有疾患均可使用。且由於下列各種特點，更能產生確定臨床效果，以普通使用量則少有副作用並可長期間服用。

1. 本劑的抗炎作用及Glucocorticoid 之作用較Cortisone或Hydrocortisone強3-5倍，少量即可產生優良的臨床效果。
2. 本劑對電解質代謝的影響殊少，且由水分貯留而引起的浮腫，體重增加或由鉀之損失所引起的心臟衰弱等亦極稀少，以普通治療量不再需要食鹽的攝取限制或鉀的補給。
3. 本劑普通的治療量對血壓少有影響，雖高血壓合併患者服之亦為安全。
4. 本劑對造血臟器機能無障害反而由於本劑的服用，可見到赤血球沈降速度昂進的遲緩。
5. 本劑對蛋白質代謝與Cortisone及hydrocortisone同樣具有促進作用。

【適應症】

癩麻質性疾患、過敏性疾患、炎症性皮膚疾患及可體松有效之適應症。

【用法·用量】

1. 本藥須由醫師處方使用。
2. 本劑在範圍內可供各種疾患使用，故應將疾病種類及症狀的輕重，患者的特質以及其他藥劑之併用等考慮，然後始予決定每一患者用法暨用量。成人通一日量為4錠，(20mg)於每食後及就寢前計4次，或分早晚二次經口服用。以此用量經過數日若仍未見理想效果時以及重症例可增加一日量為6至10錠(30~50mg)，輕症例一日量一至三錠(5~15mg)由以上藥量，若症狀轉佳，可每隔二至三日漸次減量1/2至1錠(2.5~5mg)，然後決定一日最少有效量並以此為維持量，每日經口服用之，病症再發時可漸次增加用量抑制症狀的進展，症狀初癒雖無服用本劑之必要示勿遽而中止應漸次減量停服。

【注意】

1. 慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
2. 對消化管障礙如胃腸潰瘍患者務請特別注意。
3. 因主要副作用引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
4. 糖尿病患者使用時，請注意增加INSULIN之用量。
5. 對於有精神病因素者多加注意。
6. 服用本劑期間請充分補充蛋白質。

【包裝】10, 100, 500, 1000粒等粒瓶裝。



美西製藥有限公司
高雄市仁武區工業一路九號

