

無麻醉性鎮咳劑

羅咪咳嗽甜漿

ROMITUSSIN SYRUP

內衛藥製字第005900號

「成份」：每10ml含有：

Dextromethorphan Hydrobromide	10mg
Phenylephrine Hydrochloride	5mg
Pyrilamine Maleate	25mg
Ammonium Chloride	120mg
Potassium Guaiacolsulfonate	100mg

「功效」：

羅咪咳嗽甜漿根據治療咳嗽學理，參考美國目前臨床常用鎮咳處方，悉心調配，內不含麻醉劑，具有蘋果芳香滋味，甘甜可口，無苦味，不論何種原因所致之咳嗽，從醫院到家庭，老少患者均宜服用。特介紹各主成分之功效如下：

(1)Dextromethorphan Hydrobromide:本品屬於鎮靜性之止咳成分，美國藥局方(National Formulary)最新版列為法定藥品，其止咳作用與可待因相同，但無可待因之成癮性及鎮痛、便秘、心悶、嘔吐等副作用，自瑞士Roche研究所首先研究成功合成本品以Romilar名稱供應醫藥界以來，大家均公認其為目前之理想鎮咳劑，採其代替可待因使用，又因本品無麻醉性不致成癮，故不列入國際麻醉藥品管制之內，可以安心使用。

(2)Phenylephrine Hydrochloride:其有刺激交感神經末梢，弛緩支氣管平滑肌，擴張支氣管，緩和呼吸困難，對鼻腔與喉咽能立即消除黏膜面之充血症狀，作用較一般止咳劑所用之甲基麻黃素(d1-Methylephedrine)快而副作用低，美國藥典列為法定藥品。

(3)Pyrilamine Maleate:為一強力抗組織胺類藥品，功能消除因過敏作用而起之刺激症狀，羅咪咳嗽甜漿中含有本品，可以增強上述兩品之鎮咳與解除支氣管攣縮力量，同時

也能抑制黏膜之腫脹及亢進黏液之分泌，本品藥性溫和，服後無昏睡副作用，美國藥典列為標準抗組織胺劑。

(4)Ammonium Chloride:為一緩和性祛痰藥，對於急性支氣管炎，痰很黏和常常乾咳病人，服後有減輕炎症，稀釋痰液和溶解黏液之作用，但本品有鹹味和輕微的噁心，經調入羅咪咳嗽甜漿內，鹹味與副作用全然消失，變為可口，功效如常。

(5)Potassium Guaiacolsulfonate:本品有加快炎症產物的吸收，使痰量減少及促進破壞黏膜修復之功能，對於分泌物過多之咳嗽患者最為適合。

「特點」：

本劑有下列各種特點：

- (1)作用快速且有持續性:本劑有快速止咳功效，止咳效果可持續4~5小時，甚而10小時。
- (2)無腸管麻痺作用，服後無可待因樣之便秘現象。
- (3)無副作用，服後無可待因所會發生之嘔吐、目眩、嗜眠、倦怠等副作用。
- (4)本劑可與速而必林，氨基匹靈等退熱劑溶液調配。

「適應症」：

緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)。

「副作用」：

- (1)嗜睡、口乾、倦怠感、視覺模糊、錯亂、小便困難、心跳加快。
- (2)暈眩、神經質、躁動、顫抖、呼吸困難、虛弱、臉色蒼白。

「注意事項」：

- (1)須置於小孩接觸不到之處。

- (2)避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- (3)除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- (4)勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- (5)若為液劑，使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- (6)除非藥師、藥劑生或醫師指示，服用本類藥品時不得併服其他藥品。
- (7)不得併服含酒精飲料。
- (8)苯酮尿症(Phenylketonuria)患者不得服用本類藥品。

「警語」：

- (1)服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
- (2)除非藥師、藥劑生或醫師指示，3歲以下不建議自行使用。
- (3)除非藥師、藥劑生或醫師指示，曾經因藥物引起過敏症狀者不得服用。
- (4)若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
- (5)吸煙、慢性阻塞性肺疾，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本類藥品。
- (6)服用含抗組織胺之本類藥品後，駕車或操作危險器械時要小心。
- (7)除非有藥師、藥劑生或醫師指示，下列病患勿服用含抗組織胺之本類藥品:青光眼、

- 肺氣腫、呼吸急促、呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
- (8)不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
- (9)不要服用本類藥品超過七天。
- (10)服用本類藥品後，如果症狀沒有改善或症狀還併隨有發燒或發燒持續三天，應停藥立即就醫。
- (11)服用本類藥品後，如果喉嚨疼痛持續二天以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。

「用法用量」：

成人每次10ml，日服3-4次。

- (1)15歲以上，適用成人劑量。
- (2)11歲以上未滿15歲，適用成人劑量之2/3。
- (3)7歲以上未滿11歲，適用成人之劑量1/2。
- (4)3歲以上未滿7歲，適用成人之劑量1/3。
- (5)3歲以下之嬰幼兒，使用前請洽醫師。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

「包裝」：

60~4000ml瓶裝。



人人化學製藥股份有限公司

中壢市南園二路3號