

# 消化保胃散

內衛成製字第一七二五號

## 【成分】

有效成分及含量：每公克(g)含：Powder alpinia officinarum rhizome 良薑(57.5mg)，Cinnamon 桂通(57.5mg)，Glycyrrhiza 甘草(191.6mg)，Magnesium carbonate 碳酸鎂(95.8mg)，Sodium bicarbonate 重曹(574.7mg)，l-Menthol 薄荷腦(19.1mg)，Borneol 龍腦(3.8mg)。

【用途(適應症)】胃痛、消化不良、食傷、食慾不振。

## 【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  1. 2 歲以下。
  2. 消化道潰瘍的人。
  3. 有腎臟疾病的人。
  4. 須限鹽飲食的人。
- 5. 有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  2. 與其他藥品併用時。
- 其他使用上注意事項：
  1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
  2. 避免陽光直射。
  3. 勿超過建議使用量。
  4. 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
  5. 如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
  6. 腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。
  7. 可能引起腹脹、打嗝。

## 【用法用量】

年齡	劑量 (添附 1 公克量匙)
成人	一日三次，一次添附 1 匙或 2 匙。用開水服用。
8 歲至 15 歲以下	適用成人劑量之 1/2。
5 歲至 7 歲	適用成人劑量之 1/3。
2 歲至 4 歲	適用成人劑量之 1/6。
2 歲以下	請洽醫師診治

## 【警語】

- 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫生藥師藥劑生：

身體部位	副作用
腸胃道	腹瀉

- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
  1. 若有任何不適情況產生。
  2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】1000 公克以下塑膠瓶裝。

【類別】成藥。

PIC/S GMP 優良藥品

光南製藥股份有限公司宜蘭廠

宜蘭市黎明二路 240 號